



個人健康篇》不要輕忽症狀 主動與醫生溝通

撰文・莊芳

新流感黃金四十八小時搶救記

新流感的來勢洶洶，讓多數民眾憂心忡忡。但是，疾病本身真正的可怕之處，其實是在於對於疾病的錯誤知識，延誤了治療時間。假使人人都能擁有正確的醫療觀念，就能更進一步預防疾病傳染，降低死亡機率。



康太太認為安安可以成功打敗新流感病毒，與醫師詳細的溝通是非常重要的因素。

新

流 感 疫 情 持 續 發 燒 ， 各 國 受 到 感 染 、 死 亡 的 人 數 持 續 增 加 ， 國 內 衛

生 署 疾 病 管 制 局 公 布 的 病 例 數 也 逐 漸 上 升 。 在 台 灣 ， 最 年 幼 的 H 1 N 1 新 流 感 重 症 案 例 ， 是 一 位 年 僅 六 歲 的 男 童 ， 因 為 错 過 克 流 感 投 藥 治 療 的 時 間 ， 引 發 嚴 重 肺 炎 而 陷 入 昏 迷 ， 歷 經 一 個 月 的 診 治 ， 症 狀 依 舊 未 見 改 善 ， 最 終 宣 告 不 治 。

這 樣 令 人 感 到 遺 憾 的 事 件 ， 任 誰 也 不 願 見 到 ， 尤 其 在 新 流 感 來 勢 洶 洶 的 此 時 ， 个 人 不 �妨 先 建 立 正 確 的 醫 療 觀 念 ， 認 識 這 個 似 乎 擋 也 擋 不 住 的 疾 病 與 症 狀 。 若 是 每 个 人 都 預 先 具 備 充 足 的 知 識 ， 或 許 就 能 阻 止 悲 劇 一 再 發 生 。

成 功 克 服 流 感 康 复 的 真 實 案 例

以下是一個經歷新流感來襲，並且成功擺脫疾病的真實案例。故事的主角是一位職業婦女康太太，她的孩子日前打敗了新流感的病毒。從她的經驗可以得知，引

新流感六病程



1 受到感染：感染初期並無明顯症狀，潛伏期約一到七天。



2 出現症狀：若有輕微咳嗽、頭痛等類流感症狀時，應先待在家裡休息，多喝開水，並持續觀察。



3 出門就醫：若有發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，則應立刻就醫。



4 重症住院：出現肺炎、腦炎或心血管疾病、糖尿病等併發症。



5 加護病房：呼吸衰竭，必須使用呼吸器；血糖高，或是生命跡象不穩定之時。



6 死亡病例：約有10%～30%住進加護病房的患者會死亡。




(周日晚上十一點：出現發燒)

根據醫界專家指出，出現類流感症狀的四十八小時內應及時投藥，以下就是康太太自述小孩從發病到就醫治療的過程：

起社會大眾關注的新型流感，絕對有機會治癒，最重要的是正確而及時的醫治。

攝影·陳永鈞



(周一上午八點：決定送醫)

星期一早上，安安的高燒有點退了，原本要照平常一樣送他去安親班。我到了辦公室後，打電話回家問孩子的情形時，有一點不對勁。星期六他回到家裡，不時覺得時就出現發燒的情況，接著深夜十二點就嚴重地上吐下瀉。

(周一上午十一點：快速篩檢流感病毒，之後開立克流感處方)

主治醫師看安安一副活力充沛的樣子，不疑有他，打算開一般感冒藥作為處方。但我依照在網路上查出的資料，一再和醫師溝通，告知孩子過去這段時間曾經發燒、嘔吐與腹瀉，和新流感病症極為相似，這才說服醫師採取喉頭檢體，快速篩檢流感病毒。

等待檢驗報告的一小時空檔裡，安安反常地突然要求找個位子坐下來，不再好動地跑來跑去，大約經歷二十分鐘後，情況更為嚴重了。當時室外溫度高達三十度，他卻突然告訴我，覺得身體好冷好冷，我只好緊緊抱著他為他取暖。就在短短的時間裡，他已發燒到三十九度，最

我先生上班前提醒我可以上網查一下H1N1新流感的症狀。我當時壓根對這個疾病一無所知，結果上網查詢「新流感」，發現其中有發燒、嘔吐、腹瀉等，全是我兒子已經出現的症狀，立即感到不妙，決定請假回家，帶小孩上醫院。

我帶著安安出門時，雖然他已經發燒

到三十八度多，但看起來精神很好，甚至還有力氣和我一起步行十多分鐘到家附近的醫院就診。到了醫院，原本掛號內科，後來又轉至小兒科，耗費了不少時間，但一直到醫師看診，安安都沒有任何異樣。




攝影：翁世傑

黃立民醫師

關於新流感的三點提醒

- 1 出現感冒症狀後，盡量在家休息，避免傳染他人。
- 2 假使罹患類流感，必須有就醫二次以上的準備。
- 3 不過度依賴快篩檢驗，充分了解病況更重要。



他補充說，每年光是死於一般流行性感冒的患者就有大約千分之一，而新流感的致死率又提高了一些，假使以千分之二來估算，等於每五百人就有一人患新流感而死亡，而且這個比率還是在有足夠藥品的情況下，「因此，只要懂得流感的專業人士，都會感到戒慎恐懼，千萬不能小看這次流感帶來的衝擊。」

「尤其是有些人抵抗力較弱，或是本身患有慢性病，就更要小心因流感而出現的併發症。」黃立民進一步說明，流感的重症就是腦炎、肺炎、心肌炎等，這些病症一旦出現，將會延長治療難度與時間。

後，只好向護士借來一條毯子，將他整個身體包覆起來保暖。

過了一會兒，檢驗報告終於出來了，確定安安得了A型流感，其中有八成五的機率是新流感。於是醫師立刻開克流感，一天兩顆、連續五日的處方給安安，並且叮嚀我說，假使安安回到家持續高燒不退，或是出現呼吸不順暢的情況，一定要


(周三下午三點：退燒，確認康復)

送安安回家以後，他吃了藥立即呼呼大睡，本來我和先生還擔心他白天睡覺，會導致晚上無法入睡，結果他竟然整整睡了連續十八個小時才起來。儘管如此，周一夜裡我先生幫他量耳溫，依然高達三十九・八度。

上述的案例後指出，很多民眾太過輕忽這次流行性感冒，這是嚴重的錯誤！根據世界衛生組織估計，全球約有三分之一的人口將被感染新流感，以台灣二千三百萬人口來推算，大約有八百萬人會受感染，「愈是小心謹慎的人，愈能夠降低感染的機率。」

一旦有感染跡象，應立刻就醫

台大醫院兒童感染科主任黃立民聽了我們完全按照醫師規定讓他定時服藥，很快的就在隔日退燒了，周二晚上再測耳溫已回到三十七度多，接著周三早上體溫回到正常的三十六度五，我們就放心了。果然，周三下午三點回診，醫師已確認康復。整個療程在家隔離七天，現在，他又恢復以往的健康，整天蹦蹦跳跳的！



資料來源：《TIME》雜誌

這也顯示出求診時良好溝通的重要性，無論自己或是周遭親屬可能罹患新流感，除了及早就醫以外，還要向醫師詳細說明病情，才能協助醫師作出正確診斷，增加病情痊癒的機率。

黃立民提醒，假使罹患感冒，必須要有上二次醫院的心理準備。因為擔心新流感未來造成大流行，醫院求診病患過多，所以第一次應先到家裡附近診所就診，無論結果是否為新流感，回家以後都應仔細觀察病情有無好轉。「假使感覺身體更為不適，就要立即再到大醫院檢查。」黃立民表示，為了避免病情變壞、誤診的情況發生，病患一定要不厭其煩，以自救來增加存活率。

求診時良好溝通的重要性

黃立民提醒，假使感冒，必須要有上二次醫院的心理準備。因為擔心新流感未來造成大流行，醫院求診病患過多，所以第一次應先到家裡附近診所就診，無論結果是否為新流感，回家以後都應仔細觀察病情有無好轉。「假使感覺身體更為不適，就要立即再到大醫院檢查。」黃立民表示，為了避免病情變壞、誤診的情況發生，病患一定要不厭其煩，以自救來增加存活率。

但是，偏偏流行性感冒難以預防，它和幾年前人人害怕的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）本質並不相同。罹患SARS，基本上只要透過隔離就能夠降低傳染機率；可是新型流感，雖

然同樣經歷發燒症狀，卻因高度傳染力的病毒而難以防堵。除了勤洗手、戴口罩，等待十一月的疫苗上市以外，「我可以說，幾乎沒有什麼預防的方法，重點還是要持續關注自己身體的情況。」也就是說，一旦感覺感染跡象，如發燒、腹瀉、肌肉痠痛等症狀，就要立刻就醫。